

6264182201 BPE 1A ENGLISH БЪЛГАРСКИ FRANÇAIS ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ITALIANO PORTUGUES ROMANA ESPAÑOL TURKCE

One Component Self-Etching Light-Cured Dental Adhesive



TOKUYAMA BOND FORCE II

TOKUYAMA BOND FORCE II Pen

Last updated 2022-02-28 Rev.B

ENGLISH

Read all information, precautions and notes before using.

■PRODUCT DESCRIPTION AND GENERAL INFORMATION

1. TOKUYAMA BOND FORCE II is a one-component, one-coat application, self-etching, light-cured, dental adhesive system with excellent handling and adhesive properties and exceptional marginal integrity toward cut/cut enamel and dentin when used in combination with light- or dual-cured composite materials.
2. A light-curing unit having the camphorquinone (CQ) wavelength range (peak: 470nm, spectrum: 400 to 500nm) can be used for curing TOKUYAMA BOND FORCE II.
3. TOKUYAMA BOND FORCE II contains Phosphoric acid monomer, Bisphenol A di(2-hydroxy propyl) dimethacrylate (Bis-GMA), Triethylene glycol dimethacrylate, 2-Hydroxyethyl methacrylate (HEMA), Camphorquinone, alcohol and purified water. The pH level immediately after dispensing is approximately 2.5.
4. TOKUYAMA BOND FORCE II is available in three convenient dispensing systems, Bottle, Pen-Type and Unit Dose. Please check with your local distributor for availability.

■INDICATIONS

- Bonding of light- or dual-cured composite material to: - cut/cut enamel, - cut/cut dentin, - finished porcelain/composite repair.
- CONTRAINDICATIONS
- TOKUYAMA BOND FORCE II contains methacrylic monomers, organic solvents and acids. DO NOT use on patients allergic to or hypersensitive to methacrylic monomers, related organic solvents and acids.
- PRECAUTIONS
- 1) DO NOT use TOKUYAMA BOND FORCE II for any purpose other than those listed in these instructions. Use TOKUYAMA BOND FORCE II only as directed herein.
- 2) TOKUYAMA BOND FORCE II is designed for safe and use by licensed dental care professionals only. It is not designed for sale nor is it suitable for use by non-dental care professionals.
- 3) DO NOT use TOKUYAMA BOND FORCE II if the safety seals are broken or appear to have been tampered with.
- 4) If TOKUYAMA BOND FORCE II causes an allergic reaction or oversensitivity, discontinue its use immediately.
- 5) Use examination gloves (plastic, vinyl or latex) at all times when handling TOKUYAMA BOND FORCE II to avoid the possibility of allergic reactions from methacrylic monomers. Note: Certain substances/materials may penetrate through examination gloves. If TOKUYAMA BOND FORCE II comes in contact with the examination gloves, remove and dispose of the gloves, and wash hands thoroughly with water as soon as possible.
- 6) Avoid contact with TOKUYAMA BOND FORCE II with eyes, mucosal membrane, skin and clothing.
- If TOKUYAMA BOND FORCE II comes in contact with eyes, thoroughly flush eyes with water and immediately contact an ophthalmologist.
- If TOKUYAMA BOND FORCE II comes in contact with the mucosal membrane, wipe the affected area immediately, and thoroughly flush with water after the restoration is completed. Affected areas may whiten from protein coagulation, but such whitening should disappear within 24 hours. If such whitening does not disappear within 24 hours, immediately contact a physician, and the patient should be so advised.
- If TOKUYAMA BOND FORCE II comes in contact with the skin or clothing, immediately saturate the area with alcohol-soaked cotton swab or gauze.
- Instruct the patient to rinse his mouth immediately after treatment.
- 7) TOKUYAMA BOND FORCE II should not be ingested or aspirated. Ingestion or aspiration may cause serious injury.
- 8) To avoid the unintentional ingestion of TOKUYAMA BOND FORCE II, do not leave it unattended within the reach of patients and children.
- 9) DO NOT expose TOKUYAMA BOND FORCE II or the vapor to open flame because TOKUYAMA BOND FORCE II is flammable.
- 10) DO NOT avoid cross or lowering bond strength, DO NOT reuse the disposable applicator. Clean the dispensing unit thoroughly with alcohol.
- 11) DO NOT use TOKUYAMA BOND FORCE II directly to the cavity being in close proximity to the pulp. Pulp protection with glass ionomer lining or calcium hydroxide is recommended.
- 12) When using a light-curing unit, protective eyewear, glasses or goggles should be worn at all times. Be aware that when a restoration is being placed on occlusal or buccal cusp (clenching, grinding or tapping), the repaired restoration may chip again.
- 13) If not in use for a prolonged period of time, store in a cool dark place.
- 14) TOKUYAMA BOND FORCE II is not compatible with other brands of primers or adhesives.
- 15) TOKUYAMA BOND FORCE II should be brought to room temperature before using if it is stored under refrigeration.
- 16) Do not use the Pen dispensing system.
- DO NOT push the button when the cap is closed.
- DO NOT push the button when the nozzle is facing up.
- Avoid holding the Pen vertically while dispensing.
- DO NOT use the Pen directly in the oral cavity.
- DO NOT dismantle the Pen.

■PRECAUTIONS FOR MEDICATIONS AND MATERIALS

- 1) Some materials and medications (hemostatic materials) inhibit the adhesion of TOKUYAMA BOND FORCE II for an extended period even after careful meticulous cleansing with water. DO NOT USE products which contain: - eugenol, - diamine silver thioether [molecular formula: Ag(NH₂)₂], - phenols such as paraethoxyphenol, guaiacol, phenol, - aluminum chloride, - ferric sulfate, - aluminum sulfate, - epierythrine.
- 2) TOKUYAMA BOND FORCE II does not adhere to tooth structure immediately after applications of materials which contain: - hydrogen peroxide (oxygenol), - sodium hypochlorite.
- 3) We advise avoiding the use of these materials on the day of cementation, however these materials can be used for post-canal treatment as the inhibition caused by these materials usually evaporates within five days.
- STORAGE
- 1) Store TOKUYAMA BOND FORCE II at a temperature between 0 to 25°C (32 to 77°F). Storage under inappropriate condition will accelerate the degradation of TOKUYAMA BOND FORCE II.
- 2) If not in use for a prolonged period of time, store in a cool dark place.
- 3) Keep away from heat, direct sunlight, sparks and open flames.
- 4) DO NOT use after the indicated expiration date on the bottle/package.
- DISPOSAL
- 1) Unused TOKUYAMA BOND FORCE II is to be absorbed into an inert absorbent material such as gauze or cotton, and disposed of in accordance with local regulations.

■CLINICAL PROCEDURES

1. **Cleaning**
Thoroughly clean the tooth surface with a rubber cup and a fluoride-free paste then rinse with water.
2. **Isolation**
The rubber dam is the preferred method of isolation.
3. **Cavity preparation**
Prepare the cavity and rinse with water. Add bevies to the enamel margins of anterior preparations (class III, IV, V), as well as chamfers to the margins of posterior preparations (class I, II). Bevels and chamfers assist in retaining cementation between the cavity margins and the restoration, enhancing both esthetics and retention.
4. **Etching**
- If there is an adherent surface including uncut enamel, apply etching agent to the uncut enamel.
- In case of porcelain/composite repairs, roughen the surface with a bur or a diamond point to prepare the area for adhesion; apply phosphoric acid for cleaning; rinse thoroughly with water; air dry thoroughly and treat with a silane coupling reagent according to its manufacturer's instructions.
5. **Drying**
Dry the cavity by blotting with an air syringe.
- DO NOT desiccate the vital tooth. Desiccation can lead to post-operative sensitivity.
- The substances listed below inhibit curing and should be removed from the tooth surface by thoroughly cleaning the tooth surface with alcohol, citric acid, or the application of phosphoric acid for 2 to 3 seconds before application.- 1) Oil mist from handpiece,- 2) Saliva, blood and exudates.

■Pulp Protection

Glass ionomer lining or calcium hydroxide should be applied if the cavity is in close proximity to the pulp. DO NOT USE EUGENOL BASED MATERIALS to protect the pulp as these materials will inhibit the curing of TOKUYAMA BOND FORCE II.

■6. Dispensing

- 6-1. Unit Dose
Test open the Unit Dose container and dry the disposable applicator.
- When opening the cap, make sure to verify the top and bottom of the container.
- To avoid cross infection, do not reuse the material on other patients.

6-2. Bottle

Open the Bottle by removing the cap and dispense one or two drops of adhesive into the dispensing well. Immediately after dispensing, tightly replace the Bottle cap.

- Be sure to hold the Bottle of TOKUYAMA BOND FORCE II vertically when dispensing. Do not hold the Bottle diagonally or horizontally while dispensing; this could cause the adhesive to flow back into the nozzle and become contaminated.


- Wipe off excess adhesive from the tip of the nozzle prior to closing.

6-3. Pen

Open the Pen by removing the cap when the cap is facing up and dispense one or two drops of adhesive while holding by holding the Pen vertically and pushing on button repeatedly until adhesive starts to flow (or 2 to 3 pushes). * This depends on how the button is pushed and the position that the Pen is being held. Immediately after dispensing, tightly replace the Pen cap.

- Be sure to hold the Pen vertically when dispensing. Do not hold the Pen diagonally or horizontally while dispensing; this could cause the adhesive to flow back into the nozzle and become contaminated.

- Wipe off excess adhesive from the tip of the nozzle prior to closing.



The Indicator allows users to monitor the remaining amount of adhesive. Black Line moves closer to the E as the amount of material decreases. When the line nears "F", this indicates that the Pen is almost empty. This is not an exact reading but only an indication of the remaining material.

7. Application

Using the disposable applicator, apply TOKUYAMA BOND FORCE II on the surface to be bonded and wait 10 seconds or more.

- Ensure TOKUYAMA BOND FORCE II covers all surfaces where the composite resin will be applied.

- Protect the dispensed adhesive and the inserted applicator from ambient light before the application.

Unit Dose: keep the applicator in the Unit Dose container.

Bottle, Pen: use a light blocking plate.

- Complete the application within 5 minutes after dispensing because TOKUYAMA BOND FORCE II contains a volatile alcohol.

- Be careful not to allow excess TOKUYAMA BOND FORCE II to flow into the subgingival. If TOKUYAMA BOND FORCE II flows into the subgingival, thoroughly rinse and dry the area.

- If the adherent surface include ceramics, porcelain or composite, prepare the surface according to the appropriate procedures prior to the application of TOKUYAMA BOND FORCE II.

8. Air Dry

Using an oil-free air syringe, apply mild air continuously to the TOKUYAMA BOND FORCE II surface until the surface is completely dry. Do not approach too close to the adhesive.

- If accidental spattering occurs, it may cause the tissue to whiten or possible allergic reaction.

- If the adhesive is still on the tooth floor or the crown surface area, it is too thick to air-dry, blot the excess with a new disposable applicator before mild air application.

- If saliva, blood, or other fluids contaminate the applied adhesive, thoroughly rinse the cavity with water, dry and re-apply new adhesive.

- Do not rinse the applied adhesive with water except in unintentional contamination.

10. Light-cure Composite

After cementation of TOKUYAMA BOND FORCE II according to its manufacturer's instructions. The composite resin must be finished and polished.

- When self-cured composite resins are placed into a cavity, the first increment must be light-cured using a light-curing unit.

- Do not use self-cured composite resins here because the Phosphoric acid monomer contained in TOKUYAMA BOND FORCE II may interfere with the curing of the self-cured resins, leading to their premature detachment.

- If TOKUYAMA BOND FORCE II comes in contact with the skin or clothing, immediately saturate the area with alcohol-soaked cotton swab or gauze.

- Instruct the patient to rinse his mouth immediately after treatment.

7) TOKUYAMA BOND FORCE II should not be ingested or aspirated. Ingestion or aspiration may cause serious injury.

8) To avoid the unintentional ingestion of TOKUYAMA BOND FORCE II, do not leave it unattended within the reach of patients and children.

9) DO NOT expose TOKUYAMA BOND FORCE II or the vapor to open flame because TOKUYAMA BOND FORCE II is flammable.

10) DO NOT avoid cross or lowering bond strength, DO NOT reuse the disposable applicator. Clean the dispensing unit thoroughly with alcohol.

11) DO NOT use TOKUYAMA BOND FORCE II directly to the cavity being in close proximity to the pulp. Pulp protection with glass ionomer lining or calcium hydroxide is recommended.

12) When using a light-curing unit, protective eyewear, glasses or goggles should be worn at all times. Be aware that when a restoration is being placed on occlusal or buccal cusp (clenching, grinding or tapping), the repaired restoration may chip again.

13) If not in use for a prolonged period of time, store in a cool dark place.

14) TOKUYAMA BOND FORCE II is not compatible with other brands of primers or adhesives.

15) TOKUYAMA BOND FORCE II should be brought to room temperature before using if it is stored under refrigeration.

16) Do not use the Pen dispensing system.

- DO NOT push the button when the cap is closed.

- DO NOT push the button when the nozzle is facing up.

- Avoid holding the Pen vertically while dispensing.

- DO NOT use the Pen directly in the oral cavity.

- DO NOT dismantle the Pen.

■PRECAUTIONS FOR MEDICATIONS AND MATERIALS

- 1) Some materials and medications (hemostatic materials) inhibit the adhesion of TOKUYAMA BOND FORCE II for an extended period even after careful meticulous cleansing with water. DO NOT USE products which contain: - eugenol, - diamine silver thioether [molecular formula: Ag(NH₂)₂], - phenols such as paraethoxyphenol, guaiacol, phenol, - aluminum chloride, - ferric sulfate, - aluminum sulfate, - epierythrine.
- 2) TOKUYAMA BOND FORCE II does not adhere to tooth structure immediately after applications of materials which contain: - hydrogen peroxide (oxygenol), - sodium hypochlorite.
- 3) We advise avoiding the use of these materials on the day of cementation, however these materials can be used for post-canal treatment as the inhibition caused by these materials usually evaporates within five days.

■STORAGE

- 1) Store TOKUYAMA BOND FORCE II at a temperature between 0 to 25°C (32 to 77°F). Storage under inappropriate condition will accelerate the degradation of TOKUYAMA BOND FORCE II.
- 2) If not in use for a prolonged period of time, store in a cool dark place.
- 3) Keep away from heat, direct sunlight, sparks and open flames.
- 4) DO NOT use after the indicated expiration date on the bottle/package.

■DISPOSAL

Unused TOKUYAMA BOND FORCE II is to be absorbed into an inert absorbent material such as gauze or cotton, and disposed of in accordance with local regulations.

■CLINICAL PROCEDURES

1. **Cleaning**
Thoroughly clean the tooth surface with a rubber cup and a fluoride-free paste then rinse with water.
2. **Isolation**
The rubber dam is the preferred method of isolation.
3. **Cavity preparation**
Prepare the cavity and rinse with water. Add bevies to the enamel margins of anterior preparations (class III, IV, V), as well as chamfers to the margins of posterior preparations (class I, II). Bevels and chamfers assist in retaining cementation between the cavity margins and the restoration, enhancing both esthetics and retention.
4. **Etching**
- If there is an adherent surface including uncut enamel, apply etching agent to the uncut enamel.
- In case of porcelain/composite repairs, roughen the surface with a bur or a diamond point to prepare the area for adhesion; apply phosphoric acid for cleaning; rinse thoroughly with water; air dry thoroughly and treat with a silane coupling reagent according to its manufacturer's instructions.
5. **Drying**
Dry the cavity by blotting with an air syringe.
- DO NOT desiccate the vital tooth. Desiccation can lead to post-operative sensitivity.
- The substances listed below inhibit curing and should be removed from the tooth surface by thoroughly cleaning the tooth surface with alcohol, citric acid, or the application of phosphoric acid for 2 to 3 seconds before application.- 1) Oil mist from handpiece,- 2) Saliva, blood and exudates.

■Pulp Protection

Glass ionomer lining or calcium hydroxide should be applied if the cavity is in close proximity to the pulp. DO NOT USE EUGENOL BASED MATERIALS to protect the pulp as these materials will inhibit the curing of TOKUYAMA BOND FORCE II.

■6. Dispensing

- 6-1. Unit Dose
Test open the Unit Dose container and dry the disposable applicator.
- When opening the cap, make sure to verify the top and bottom of the container.
- To avoid cross infection, do not reuse the material on other patients.

6-2. Bottle

Open the Bottle by removing the cap and dispense one or two drops of adhesive into the dispensing well. Immediately after dispensing, tightly replace the Bottle cap.

- Be sure to hold the Bottle of TOKUYAMA BOND FORCE II vertically when dispensing. Do not hold the Bottle diagonally or horizontally while dispensing; this could cause the adhesive to flow back into the nozzle and become contaminated.

- Wipe off excess adhesive from the tip of the nozzle prior to closing.

6-3. Pen

Open the Pen by removing the cap when the cap is facing up and dispense one or two drops of adhesive while holding by holding the Pen vertically and pushing on button repeatedly until adhesive starts to flow (or 2 to 3 pushes). * This depends on how the button is pushed and the position that the Pen is being held. Immediately after dispensing, tightly replace the Pen cap.

- Be sure to hold the Pen vertically when dispensing. Do not hold the Pen diagonally or horizontally while dispensing; this could cause the adhesive to flow back into the nozzle and become contaminated.

- Wipe off excess adhesive from the tip of the nozzle prior to closing.

■КИНИНЧНА УПОТРЕБА

1. **Почистване**
Почиствайте изобитно зъбната повърхност с гумена щетка и паста без съдържащи на флуорид, след това изплавайте с вода.

2. **Изолиране**
Използвайте на кофердам е идеалният метод за изолация.

3. **Подготовка на кавитета**
Подгответе кавитета с промиване с вода. Сместе работете на емайла на препарирани в апертурата обик (class III, IV, V) и създайте ретикулации или по работете на постериорните препарации (class I, II). Съсчлватаня и ретикулациите отвор допринасят за зацвяване на разликите в пресичане между работите на кавитета и реставрацията, подобрявайки естетичността и ретикулацията.

- Ако е налице повърхност за зацвяване с неорганични материали, нанесете еднж авт върху този слой.

7) TOKUYAMA BOND FORCE II не дой да се ингират н аспират. Ингестия и аспирация поврзват ентраинер днамогенни гравес.

8) Afin d'éviter l'ingestion non intentionnelle de TOKUYAMA BOND FORCE II, ne pas laisser le produit sans surveillance à la portée des patients ou des enfants.

9) NE PAS exposer TOKUYAMA BOND FORCE II ou ses vapeurs à une flamme libre car TOKUYAMA BOND FORCE II est inflammable.

10) Pour éviter une infection croisée ou une réduction de l'adhérence, NE PAS RÉUTILISER l'appliqueur jetable. Prenez complètement le distributeur avec de l'alcool après chaque utilisation.

11) NE PAS APPLIQUER TOKUYAMA BOND FORCE II directement sur la cavité à proximité de la pulpe. Utilisez une bande de protection ou un vernis protecteur pour protéger la pulpe car ces substances inhibent la polymérisation de TOKUYAMA BOND FORCE II.

12) En cas d'utilisation d'une lampe à polymériser, portez toujours un masque et des lunettes de protection. Évitez l'éclaboussure du matériau sur la cavité en raison d'une mulsion de calcium ou de l'hydroxyde de calcium pour une protection de la pulpe.

13) En cas d'utilisation d'une lampe à polymériser, portez toujours un masque et des lunettes de protection. Évitez l'éclaboussure du matériau sur la cavité en raison d'une mulsion de calcium ou de l'hydroxyde de calcium pour une protection de la pulpe.

14) NE PAS MÉLANGER TOKUYAMA BOND FORCE II avec des primers ou adhésifs d'autres marques.

15) TOKUYAMA BOND FORCE II doit être mis à température ambiante avant utilisation s'il a été conservé dans un réfrigérateur.

16) Si vous utilisez le Stylo, ne pas appuyer sur le bouton lorsque le bouchon est fermé.

- NE PAS appuyer sur le bouton lorsque la buse est orientée vers le haut.

- NE pas tenir le Pen obliquement ou horizontalement pendant l'application.

- N'utiliser pas le Pen directement dans la cavité orale.

- NE démontez PAS le Pen.

■PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES MÉDICAMENTS ET LES MATÉRIAUX

Certains matériaux et médicaments (hémostatiques) inhibent l'adhésion de TOKUYAMA BOND FORCE II pour une longue période même après un nettoyage minutieux avec de l'eau. NE PAS UTILISER les produits contenant les substances suivantes:

- eugenol,
- fluore de diamine-argent [formule brute: Ag(NH₂)₂],
- phénols tels que paraéthoxyphénol, gaïacol, phénol,
- chlorure d'aluminium,
- sulfate de fer,
- sulfate d'aluminium,
- épiérythrine.

2) TOKUYAMA BOND FORCE II ne s'adapte pas à la structure de la dent immédiatement après l'application de matériaux contenant: - un oxygène,

- des composés hypochlorite de sodium.

Notons conseils d'éviter l'utilisation de ces matériaux le jour de la restauration. Toutefois, vous pouvez le faire pour le traitement canalair puisque l'inhibition provoquée par ces matériaux est levée généralement au bout de cinq jours.

- Prévenir da zăgăzire, izolațiie izbitoare a lăzării compozitei de vîră la naștrăria.

6-1. Елваторна доза

Отварете контейнера на елваторната доза чрез завъртане и потегнете аликватора за елваторна употреба.

- Когато отварите капачката, внимавайте да не размените долната и капачката на контейнера.

- Не позволявайте кръстосана инфекция на изобитно изобитно материал на други пациенти.

6-2. Буталка

Отварете капачката на флакона и дозирате една или две капки адхезив в съда за дозиране.

- Внимавайте внимателно флакона и капачката на флакона, когато дозирате.

- Не дозирате адхезива диагонално или хоризонтално по време на дозиране; в противен случай адхезивът може да попадне обратно в накрайника и да се замърси.

- Преди да затворите, изберете изобитно количество адхезив от върха на накрайника.

6-3. Писалка

Отварете капачката (сложете нагоре) на писалката и дозирате една или две капки адхезив в съда за дозиране, като държите писалката отворена и натиснете минората, която дозирате.

- Внимавайте писалката, когато дозирате.

- Не дозирате адхезива диагонално или хоризонтално по време на дозиране; в противен случай адхезивът може да попадне обратно в накрайника и да се замърси.

- Преди да затворите, изберете изобитно количество адхезив от върха на накрайника.

10. Светло-чувствителен композит

След циментоване на TOKUYAMA BOND FORCE II според инструкциите на производителя. Композитният материал трябва да бъде полиран и полиран.

- Когато се използват композитни смески, първият слой трябва да бъде светлочувствителен.

- Не използвайте композитни смески тук, защото фосфорната киселина, съдържаща се в TOKUYAMA BOND FORCE II, може да намали адхезивните свойства на композитните смески.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

- Ако TOKUYAMA BOND FORCE II влезе в контакт с кожата, веднага изплавайте с вода и се консултирайте с лекар.

conservazione in condizioni non idonee accelera il processo di degradazione di TOKUYAMA BOND FORCE II.

2) Se non viene usato per periodi di tempo prolungati, conservarlo al buio in un luogo fresco.

3) Tenere lontano da fonti di calore, luce solare diretta, scintille e fiamme libere.

4) NON utilizzare dopo la data di scadenza indicata sul flacone/confezione.

■SALUTAMENTO

Si raccomanda di assorbire l'adesivo TOKUYAMA BOND FORCE II non utilizzato con un materiale assorbente inerte, ad esempio una garza o cotone, e smaltirlo in conformità ai regolamenti locali.

■PROCEDURE CLINICHE

1. **Pulizia**

Pulire accuratamente la superficie del dente con una cospetta in gomma e una pasta

2. Isolamento

Il miglior metodo di isolamento è la diga in lattice.

3. Preparazione della cavità

Preparare la cavità e scattare una copia. Praticare un bisello sui margini dello smalto delle preparazioni anteriori (classi III, IV), nonché un chanfer sui margini delle preparazioni posteriori (classi I, II), poiché i biselli e chanfer sono d'aiuto nell'eliminazione della linea di demarcazione tra i margini cavità e il restauro, migliorando così l'aspetto estetico della ritenzione e l'aspetto estetico del cavo.

- Se la superficie di adesione interna dello smalto non frusta, applicare su quest'ultimo un agente mordente.

- In caso di riparazioni su porcellana/composito, irroriare la superficie con una fresa o una punta diamantina per preparare l'area all'adesione; applicare acido fosforico per la pulizia, sciacquare accuratamente con acqua, asciugare a fondo con aria e trattare con agente silano, attendendo alle istruzioni del produttore.

4. **Asciugatura**

Asciugare la cavità utilizzando una tecnica "blotting" o una siringa piena d'aria.

- NON estrarre il dente vitale. L'essiccazione può causare sensibilità post-operatoria.

- Le sostanze cattediche di seguito, che pregiudicano l'adesione, devono essere eliminate dalla superficie dentale mediante pulizia accurata con alcool, acido citrico o l'applicazione di acido fosforico per 2-3 secondi prima dell'applicazione.

1) Saliva, sangue ed esudato.

2) Nerbizzazione contaminata con l'olio del manipolo.

5. **Protezione della polpa dentale**

Se la cavità dentale si trova nelle immediate vicinanze della polpa, si raccomanda di applicare un rivestimento vetroionomero o idrossido di rame. NON USARE MATERIALI A BASE DI EPOXYDE per proteggere la polpa, poiché tali materiali inibiscono la polimerizzazione di TOKUYAMA BOND FORCE II.

6. **Impressione**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

7. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

8. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

9. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

10. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

11. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

12. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

13. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

14. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

15. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

16. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

17. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

18. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

19. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

20. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

21. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

22. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

23. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

24. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

25. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

26. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

27. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

28. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

29. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

30. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

31. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

32. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

33. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

34. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

35. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

36. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

37. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

38. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

39. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

40. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

41. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

42. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

43. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

44. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

45. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

46. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

47. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

48. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

49. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

50. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

51. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

52. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

53. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

54. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

55. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

56. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

57. **Protezione della polpa dentale**

1) Non usare TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte.

2) Se si utilizza TOKUYAMA BOND FORCE II per la presa di impronte, si consiglia di utilizzare un agente mordente.

- Se o TOKUYAMA BOND FORCE II entra in contatto con a mucosa, limpe immediatamente la area estradentale e após a restauração ser concluída, lave com água. As áreas afetadas podem ficar escurecidas devido às proteínas de coagulação, alteração essa que deve passar ao fim de 24h, se não se registar melhorias ao fim desse deve contactar o médico assistente o o paciente deverá ser avisado.

- Se o TOKUYAMA BOND FORCE II entra em contacto com a roupa ou com a pele deve saturar a área com um cotonete/compressa embebida em álcool.

- O paciente deve ser instruído a bochechar imediatamente ao procedimento.

7) TOKUYAMA BOND FORCE II não deve ser ingerido ou aspirado. A ingestão ou aspiração pode provocar lesões graves.

8) Para evitar a ingestão accidental não deve TOKUYAMA BOND FORCE II ao alcance de pacientes, crianças ou adultos sem supervisão.

9) Não exporia TOKUYAMA BOND FORCE II ou os seus vapores a uma chama exposta uma vez que TOKUYAMA BOND FORCE II é inflamável inflamável.

10) Para evitar a infecção cruzada ou a diminuição das forças adesivas, não reutilize o aplicador descartável.

11) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II diretamente na cavidade se este estiver muito próxima da pulpa. Está aconselhada a proteção pulpar com revestimento da cavidade com ionômero de vidro ou flúor.

12) Deve-se usar óculos de proteção ou viseiras quando a utilização de um fotopolimerizador.

13) Tenha em atenção que quando uma restauração fractura por mau occlusão ou bruxismo (clínico, químico, térmico, térmico) a restauração reparáda não reutilize o material novamente.

14) Não misture TOKUYAMA BOND FORCE II com primers ou adesivos de outras marcas.

15) TOKUYAMA BOND FORCE II deve estar à temperatura ambiente quando utilizado.

16) Quando utilizado o sistema dispensador em caixas:

- Não carregue no boteão se a caneta estiver com a tampa.
- Não carregue no boteão se o local estiver voltado para cima.
- Não pegue na caneta na horizontal/diagonal durante a utilização.
- Não use a caneta diretamente na cavidade oral.
- Não desmonte a caneta.

■ **Precações com medicamentos e materiais**

1) Alguns materiais e medicamentos (hemostáticos) inibem a adesão de TOKUYAMA BOND FORCE II por um período prolongado mesmo após uma limpeza metódica com água. Não use produtos que contenham:

- Eugenol
- Flúoreto de prata diamado
- Fenóis como paracloretofenol, guaicol e fenol
- Cloreto de alumínio
- Sulfato férrico
- Sulfato de alumínio
- Epifenina

2) TOKUYAMA BOND FORCE II não adere à estrutura dentária imediatamente após a aplicação de materiais que contenham:

- Peróxido de hidrogênio (óxido)
- Hipoclorito de sódio

3) Armazenamento

Armazene TOKUYAMA BOND FORCE II em uma temperatura entre 0 a 25 ° C (32 a 77 ° F).

4) Não use para uso por períodos prolongados armazenar em local fresco e escuro

5) Mantenha longe do calor, exposição solar direta, fumaça e chamas.

6) Não utilize após a data de validade indicada no frasco/embalagem.

■ **Contraindicações**

Não utilize o líquido de cura se descartado para uma compressa, algodão ou qualquer material absorvente e eliminado de acordo com as regulações locais.

■ **Procedimentos clínicos**

1. **Limpeza:**

Pulpe cuidadosamente a superfície dentária com uma taça de borraça e uma pasta sem flúor, depois passe por água.

2. **Isolamento**

O dígito de borraça é o método preferencial de isolamento.

3. **Preparação da cavidade**

Preparar a cavidade e passar por água. Acrescentar um bisel nas margens de esmalte em preparações de dentes anteriores (classes III, IV), assim como chanfros às margens das preparações de dentes posteriores (class I, II). O bisel e o chanfro vão melhorar a estética e a retenção da restauração uma vez que ajudam a atenuar a transição dentina/composito.

Se existir uma superfície aderente que inclua esmalte não preparado, efetuar o condicionamento ácido no esmalte não preparado.

Se a preparação de composito for profunda, despolir a superfície com uma broxa ou ponta diamantada para preparar a área para a adesão, aplicar ácido ortofosfórico, lave cuidadosamente com água e seque, e aplicar um silano de acordo com as indicações do distribuidor local.

4. **Secar**

Use uma cavidade com a seringa de ar.

- Não desidrate o dente vital. A desidratação do dente vital pode levar a sensibilidade pós-operatória.

- As substâncias ácidas enumeradas inibem a polimerização e devem ser renovadas da superfície do dente por intermédio de uma limpeza metódica com álcool, ácido cítrico ou aplicação de ácido fosfórico durante 2 a 3 segundos antes da aplicação.

5. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

6. **Impressão**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

7. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

8. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

9. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

10. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

11. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

12. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

13. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

14. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

15. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

16. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

17. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

18. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

19. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

20. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

21. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

22. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

23. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

24. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

25. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

26. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

27. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

28. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

29. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

30. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

31. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

32. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

33. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

34. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

35. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

36. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

37. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

38. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

39. **Proteção da polpa dentale**

1) Não use TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão.

2) Se se utiliza TOKUYAMA BOND FORCE II para a impressão, se recomenda de utilizar um agente mordente.

Nota importante: O fabricante não é responsável por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso incorreto do produto. É da responsabilidade do utilizador assegurar-se que este produto se encontra em condições apropriadas para uma adequada aplicação antes de usar.

As seguintes aplicações estão contra-indicadas a mudança sem aviso. Quando as especificações mudam as instruções e precauções mudam também.

ROMÂNĂ

Citiți toate informațiile, măsurile preventive și observațiile înainte de utilizare.

■ **DESCRIȚIIEA PRODUCTULUI ȘI INFORMAȚII GENERALE**

1. TOKUYAMA BOND FORCE II este un sistem adeziv dentar fotopolimerizabil, autocolant, cu o singură componentă și cu aplicare într-un singur strat, cu proprietăți adezive și de manipulare excelente și cu rezistență ridicată la uzură în condiții de funcționare obișnuite.

2. Pentru polimerizarea produsului TOKUYAMA BOND FORCE II se poate utiliza un dispozitiv de fotopolimerizare cu intervalul de lungime de undă al camforonului